

SUR DEUX DÉFORMATIONS OBSERVÉES
CHEZ DES PLACOSTYLUS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Par PH. DAUTZENBERG.

PLACOSTYLUS PORPHYROSTOMUS Pfeiffer, monstr.

(Pl. VII, fig. 7).

Chez cet individu, les trois premiers tours sont enroulés normalement, tandis que les deux derniers présentent, vers le haut, une carène bien accusée. La lésion qui a produit cette modification du test est bien visible sur la face latérale de la coquille, mais ne peut s'apercevoir sur la coquille vue de face, telle que nous l'avons représentée.

Un cas tératologique tout-à-fait semblable a été signalé par M. Crosse chez un *Placostylus fibratus* Martyn (*Journal de Conchyliologie*, t. XXIX, 1881, p. 341, pl. XI, fig. 3) : la seule différence consiste en ce que la lésion s'est produite plus tôt chez le *fibratus*, de sorte qu'il a les trois derniers tours carénés.

Habitat. La Foa (Nouvelle-Calédonie) ; notre collection.

PLACOSTYLUS FIBRATUS Martyn, var. insignis Petit, monstr.

(Pl. VII, fig. 8).


Le *Placostylus* que nous représentons ici affecte une forme scalaroïde nettement accusée ; mais en examinant

la coquille, on constate que cette déformation ne s'est produite qu'après le quatrième tour et à la suite d'un accident. Jusque-là, l'enroulement était, en effet, parfaitement régulier et ce n'est qu'à partir de la lésion (au point L. de notre figure), que la suture s'est accusée et descend rapidement.

Le spécimen dont nous nous occupons est intéressant parce qu'il possède un tour de plus que la forme normale de la var. *insignis*; son pli columellaire est aussi très développé.

Habitat. Nouvelle-Calédonie (notre collection).

Рн. D.



Sheppard, del.

Imp. Monrocq-Paris.

- 1, 2. *Peronaeus iocosensis* Dautzenberg
 3, 4. *P. Baeri* Dautzenberg
 5, 6. *Leucocharis porphyrochila* Dautzenberg et Bernier
 7. *Placostylus porphyrostomus* Pfeiffer, monstr.
 8. *P. fibratus* Martyn, var. *insignis* Petit, monstr.